

ED

ED（勃起障害）って？

- 性交時に十分な勃起が得られないため、あるいは十分な勃起が維持できないため、「満足な性交が行えない状態」と定義されています。ストレスなどの心因性によるEDや、事故によるけがや手術の後遺症としてEDになる場合、生活習慣病によって起こるEDなど様々な原因があります。
- ED（勃起障害）治療を受ける人の約7～8割はこれらの服用で治ります。

ED問診票①

・国際勃起機能スコア5(※項目の右の数字が点数)

- ・ ①勃起を維持する自信の程度はどれくらいありましたか。
 - ・非常に低い 1 低い 2 普通 3 高い 4 非常に高い 5
- ・ ②性的刺激による勃起の場合、何回挿入可能な勃起の硬さになりましたか。
 - ・ 性的刺激一度もなし 0 まったくなし、またはほとんどなし 1
 - ・ たまに(半分よりかなり下回る回数) 2 時々(半分くらい) 3
 - ・ おおかた毎回(半分よりかなり上回る回数) 4 毎回、またはほぼ毎回 5
- ・ ③性交中、挿入後何回勃起を維持することができましたか。
 - ・ 性交の試み一度もなし 0 まったくなし、またはほとんどなし 1
 - ・ たまに(半分よりかなり下回る回数) 2 時々(半分くらい) 3
 - ・ おおかた毎回(半分よりかなり上回る回数) 4 毎回、またはほぼ毎回 5
- ・ ④性交中、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか。
 - ・ 性交の試み一度もなし 0 ほとんど困難 1 かなり困難 2 困難 3 やや困難 4 困難でない 5
- ・ ⑤性交を試みたとき、何回満足に性交できましたか。
 - ・ 性交の試み一度もなし 0 まったくなし、またはほとんどなし 1
 - ・ たまに(半分よりかなり下回る回数) 2 時々(半分くらい) 3
 - ・ おおかた毎回(半分よりかなり上回る回数) 4 毎回、またはほぼ毎回 5

いかがでしたか。合計点数が21点以下の場合「EDの疑いあり」と診断されます。

ED問診票②

- ①以前薬によって過敏症状をおこしたことがありますか はい いいえ
- ②心臓の病気などでニトログリセリンなどの硝酸剤（舌下、貼付、スプレー）を使用していますか？ はい いいえ
- ③狭心症、心筋梗塞などがありますか？ はい いいえ
- ④肝臓の病気がありますか？ はい いいえ
- ⑤低血圧または高血圧と言われたことはありますか？ はい いいえ
- ⑥脳梗塞、あるいは脳出血をおこしたことがありますか？ はい いいえ
- ⑦網膜色素変性症と診断されたことがありますか？ はい いいえ
- ⑧陰茎の病気（屈曲、しこり）などがありますか？ はい いいえ
- ⑨血液の病気（鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病など） はい いいえ
- ⑩他の勃起障害治療を受けていますか？ はい いいえ
- ⑪出血性の病気あるいは消化性潰瘍がありますか？ はい いいえ
- ⑫腎臓の病気がありますか？ はい いいえ
- ⑬他に使用中の薬がありますか？ はい いいえ
- ⑭他の診療科あるいは他の医療機関を受診する際にはバイアグラ、シアリスを服用していることを申し出るかまたは何らかの方法で確実に医師に伝えるようにしてください。 はい いいえ
- ⑮バイアグラ、シアリスの服用後に4時間以上勃起が続く場合はすぐに医師に連絡してください。 はい いいえ
- ⑯バイアグラ、シアリスは他の人に譲り渡さないでください。 はい いいえ
- ⑰バイアグラ、シアリス服用後は自動車、機械の運転操作には注意してください。 はい いいえ
- ⑱バイアグラ、シアリスは催淫剤（性欲増進を目的とした薬）ではありません。性的刺激を受けなければ勃起しません。ご理解頂けましたか？ はい いいえ
- ⑲バイアグラは性行為の約1時間前に服用し1日1回までで、次の服用は24時間以上あけてください。 はい いいえ
- ⑳性行為は心臓に負担をかけます。無理はしないようにしましょう。 はい いいえ

当院ではED（勃起不全）治療を行なっております（自由診療）

- 予約は不要です。受付では住所や氏名など問診票を書いていただきます。問診票にEDの診察希望があった場合は、診察室には院長のみで対応させていただきます。
- 勃起障害問診票を記載して頂きます。（ホームページからダウンロードして記載頂いたものを持参していただくことをお勧めします）

簡単な診察、問診、血圧測定などでED治療薬投与に問題がないことを確認させていただき、院長自らがお薬を診察室内でお渡しいたします。お会計も診察室内で終了です。投与リスクの可能性が示唆された場合は、適宜心電図、採血などの検査をお勧めさせて頂くことがあります。

	バイアグラ	シアリス
国内発売時期	1999年3月	2007年9月
特徴	知名度が高い	作用時間が長く、服用後の自由度が高い
食事との関係	食事の影響を受ける	食事の影響を受けない
食事と服用のタイミング	食後1時間以降に服用	食前に服用可能
服用後の発現時間	30－60分で効いてくる	30－60分で効いてくる
作用時間	4時間	36時間
服用間隔	24時間以上	24時間以上
容量	25, 50mg	10, 20mg
副作用	顔がほてる、色覚異常、頭痛、血圧低下	顔がほてる、色覚異常、頭痛、血圧低下

当院では
バイアグラ50mg
 1錠1500円
シアリス20mg
 1錠 1700円
 で提供させて頂いて
 おります（2019年2月
 現在）

ED薬を投与できない方

- ①本剤の成分に対し過敏症の既往歴がある方
- ②亜硝酸剤または一酸化窒素（NO）供与剤（ニトログリセリン、亜硝酸アミルなど）アミオダロンを投与中の方
- ③可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤（リオシグアト）を投与中の方
- ④心血管障害を有するなど性行為が不相当と考えられる方
- ⑤不安定狭心症の方または性行為中に狭心症を発現したことのある方
- ⑥コントロール不良の不整脈、低血圧（90以下）、高血圧（170以上）のある方
- ⑦心筋梗塞の既往歴が最近3ヶ月以内にある方
- ⑧脳梗塞、脳出血の既往歴が最近6ヶ月以内にある方
- ⑨重度の肝障害のある方
- ⑩網膜色素変性症の患者さん
- ⑪未成年の方

慎重投与

- ①陰茎の構造上の欠陥（屈曲など）のある方痛みなどが強くなります
- ②持続勃起症の素因となり得る疾患（鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病）のある方処置を速やかに行わないと陰茎組織の損傷、勃起機能を永続的に損なうリスクが存在します